TIROIDECTOMIA NELLA TIROIDITE DI HASHIMOTO DOLOROSA, NON RESPONDER ALLA TERAPIA MEDICA

I pazienti con tiroidite linfocitaria cronica di Hashimoto, presentano gozzo e/o ipotiroidismo e positività autoanticorpale.

Il dolore tiroideo e la dolorabilità alla compressione sono manifestazioni rare, che fanno ipotizzare una diagnosi alternativa di tiroidite granulomatosa subacuta o altre forme di tiroidite.

I Medici della Thyroid Study Unit dell'Università di Chicago hanno segnalato di 7 pazienti con tiroidite di Hashimoto dolorosa che non hanno risposto al trattamento con levo-tiroxina o con steroidi, ed hanno richiesto intervento chirurgico a causa del dolore.

Tutti i pazienti sono stati sottoposti a tiroidectomia sub-totale o quasi totale.

All'esame istopatologico in tutti i campioni è stata osservata tiroidite linfocitaria, con diversi gradi di fibrosi.

Dopo l'operazione 4 pazienti hanno ottenuto scomparsa del dolore, mentre 1 paziente è rimasto solo con un lieve disturbo.

Un altro paziente è andato incontro ad un episodio doloroso da componente psicologica , secondo gli Autori.

Kon YC, De Groot LJ, J Clin Endocrinol Metab 2003; 88:2667-2672